

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.

- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinerator en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinerator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommiteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommiteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.
- NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
- NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

NB

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.

Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.

In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
- 2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Het achtste deel

1 maximumscore 4

- $A(p) = \int_{-9}^p \sqrt{x+9} \, dx$ 1

- Een primitieve van $\sqrt{x+9}$ is $\frac{2}{3}(x+9)^{\frac{3}{2}}$ 2

- $A(p) = \frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}(-9+9)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}}$ 1

of

- $A(p) = \int_{-9}^p \sqrt{x+9} \, dx$ 1

- De afgeleide van $\frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}}$ is gelijk aan $\sqrt{p+9}$ 2

- $A(p) = \frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}(-9+9)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}}$ 1

2 maximumscore 5

- De oppervlakte van het gebied ingesloten door de grafiek van f , de x -as en de y -as is ($A(0) = \frac{2}{3}(0+9)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \cdot 27 =$) 18 1

- Voor p moet gelden: $A(p) = \frac{18}{8}$ 1

- $\frac{2}{3}(p+9)^{\frac{3}{2}} = \frac{18}{8}$ 1

- $p+9 = \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$ 1

- Het antwoord: $p = -\frac{27}{4}$ (of $p = -6\frac{3}{4}$) 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

3 maximumscore 6

- Een vergelijking voor het spiegelbeeld van de grafiek van f is
 $y = \sqrt{-x+9}$ 1
- $g(x) = \sqrt{-x}$ 1
- De grafieken van f en g snijden elkaar voor $x = -4\frac{1}{2}$ 1
- De inhoud is $\pi \cdot \int_{-4\frac{1}{2}}^0 (x+9--x) dx$ 1
- Een primitieve van $2x+9$ is x^2+9x 1
- Invullen van de grenzen geeft $20\frac{1}{4}\pi$ 1

of

- De grafieken van f en g snijden elkaar voor $x = -4\frac{1}{2}$ 1
- De grafieken van f en g zijn symmetrisch ten opzichte van de lijn met vergelijking $x = -4\frac{1}{2}$ 1
- De inhoud van het omwentelingslichaam is gelijk aan
 $\pi \cdot \int_{-4\frac{1}{2}}^0 (f(x))^2 dx - \pi \cdot \int_{-9}^{-4\frac{1}{2}} (f(x))^2 dx$ 2
- Een primitieve van $(f(x))^2$ is $\frac{1}{2}x^2+9x$ 1
- Invullen van de grenzen geeft $20\frac{1}{4}\pi$ 1

Lemniscaat

4 maximumscore 4

- Er moet gelden $\sin t \cdot \cos t = \frac{1}{4}$ 1
- ($2 \sin t \cdot \cos t = \frac{1}{2}$ geeft) $\sin(2t) = \frac{1}{2}$ 1
- Op het interval $[0, 2\pi)$ zijn de oplossingen $t = \frac{1}{12}\pi$, $t = \frac{5}{12}\pi$, $t = \frac{13}{12}\pi$ en $t = \frac{17}{12}\pi$ 2

5 maximumscore 7

- In de oorsprong geldt $\cos t = 0$ 1
- $t = \frac{1}{2}\pi$ of $t = \frac{3}{2}\pi$ 1
- $x'(t) = -\sin t$ 1
- $y'(t) = \cos^2 t - \sin^2 t$ (of $y'(t) = \cos(2t)$) 1
- Op $t = \frac{1}{2}\pi$ is de richtingsvector van de raaklijn $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 1
- Op $t = \frac{3}{2}\pi$ is de richtingsvector van de raaklijn $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 1
- Een redenering of berekening waaruit volgt dat de hoek tussen deze vectoren 90° (of $\frac{1}{2}\pi$ (rad)) is 1

Opmerking

Als bij de laatste twee scorepunten symmetrie wordt gebruikt zonder dat deze is aangetoond, hiervoor 2 scorepunten in mindering brengen.

Twee punten

6 maximumscore 6

- De x -coördinaat van P is 0; de y -coördinaat noemen we p 1
- $\overrightarrow{AP} = \begin{pmatrix} 2 \\ p-3 \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{BP} = \begin{pmatrix} -6 \\ p-7 \end{pmatrix}$ 2
- $\begin{pmatrix} 2 \\ p-3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ p-7 \end{pmatrix} = 0$ 1
- De vergelijking $-12 + (p-3)(p-7) = 0$ geeft $p = 1$ of $p = 9$ (dus $P(0, 9)$ en $Q(0, 1)$) 2

of

- Volgens de stelling van Thales liggen P en Q op de cirkel met middellijn AB 1
- $AB = \sqrt{80}$ ($= 2\sqrt{20}$) en het midden van AB heeft coördinaten $(2, 5)$ (dus de punten P en Q liggen op de cirkel met middelpunt $(2, 5)$ en straal $\frac{1}{2}\sqrt{80}$ ($= \sqrt{20}$) 2
- Een vergelijking van de cirkel is $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 20$ 1
- Voor het snijpunt met de y -as geldt $x = 0$, dus $4 + (y-5)^2 = 20$ 1
- Dit geeft $y = 1$ of $y = 9$ (dus $P(0, 9)$ en $Q(0, 1)$) 1

of

- De x -coördinaat van P is 0; de y -coördinaat noemen we p 1
- $AB^2 = ((7-3)^2 + (6--2)^2) = 80$ 1
- $AP^2 = (3-p)^2 + (-2)^2$ 1
- $BP^2 = (7-p)^2 + 6^2$ 1
- (Pythagoras in driehoek ABP geeft) $p^2 - 10p + 9 = 0$ 1
- Dit geeft $p = 1$ of $p = 9$ (dus $P(0, 9)$ en $Q(0, 1)$) 1

7 maximumscore 6

- Een richtingsvector van lijn AB is $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (of: de richtingscoëfficiënt van lijn AB is $\frac{1}{2}$) 1
- Een toelichting of berekening waaruit volgt dat de loodlijn op AB door M lijn AB in het midden van RS snijdt in het punt $T(-4, 2)$ 2
- De afstand van M tot lijn AB is $\sqrt{5}$ 1
- $MT^2 + TS^2 = MS^2$, dus $(\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2 = MS^2$ 1
- $MS^2 = 50$, dus de straal is $\sqrt{50}$ ($= 5\sqrt{2}$) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores
	• Een vergelijking van de lijn door A en B is $y = \frac{1}{2}x + 4$	1
	• Substitutie in de vergelijking van de cirkel geeft: $(x+3)^2 + (\frac{1}{2}x+4)^2 = r^2$	1
	• $x = -4 + \frac{2}{5}\sqrt{5r^2 - 25}$ of $x = -4 - \frac{2}{5}\sqrt{5r^2 - 25}$	1
	• $R(-4 - \frac{2}{5}\sqrt{5r^2 - 25}, 2 - \frac{1}{5}\sqrt{5r^2 - 25})$ en $S(-4 + \frac{2}{5}\sqrt{5r^2 - 25}, 2 + \frac{1}{5}\sqrt{5r^2 - 25})$	1
	• $RS^2 = (\frac{4}{5}\sqrt{5r^2 - 25})^2 + (\frac{2}{5}\sqrt{5r^2 - 25})^2 = 4r^2 - 20$	1
	• $(4r^2 - 20 = 180 \text{ dus}) r = 5\sqrt{2}$	1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Stuiterende bal

8 maximumscore 3

- (Uit $h_7 = h_0 \cdot a^7 = \frac{1}{5}h_0$ volgt) $a^7 = \frac{1}{5}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $a = 0,79$ 1

9 maximumscore 5

- $2 \cdot \sqrt{\frac{h_1}{4,9}} = 1,11$ geeft $h_1 \approx 1,509$ (of nauwkeuriger) 1
- $2 \cdot \sqrt{\frac{h_4}{4,9}} = 0,68$ geeft $h_4 \approx 0,566$ (of nauwkeuriger) 1
- (h_n neemt exponentieel af met factor a dus) $a^3 \approx \frac{0,566}{1,509}$ 1
- $a \approx 0,721$ (of nauwkeuriger) 1
- $h_0 = \frac{h_1}{a} \approx \frac{1,509}{0,721} \approx 2,1$ (meter) (of 21 decimeter) 1

Opmerking

Als wordt gerekend met 2 decimalen in plaats van 3 decimalen achter de komma, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Over de muur

10 maximumscore 2

- $x_P = -4 \cos \alpha$ 1
- $y_P = 2 + 4 \sin \alpha$ 1

11 maximumscore 5

- $\frac{dy}{dt} = -10t + 20 \cos \alpha \sqrt{\sin \alpha}$ 1
- In het hoogste punt geldt $t = 2 \cos \alpha \sqrt{\sin \alpha}$ 1
- $y_{\text{top}} = -5(2 \cos \alpha \sqrt{\sin \alpha})^2 + 2 + 4 \sin \alpha + 20 \cdot 2(\cos \alpha \sqrt{\sin \alpha})^2$ 1
- $y_{\text{top}} = 2 + 20 \sin \alpha \cos^2 \alpha + 4 \sin \alpha$ 1
- $y_{\text{top}} = 2 + 20 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + 4 \sin \alpha = 2 + 24 \sin \alpha - 20 \sin^3 \alpha$ 1

of

- In het hoogste punt geldt $t = -\frac{b}{2a} = -\frac{20 \cos \alpha \cdot \sqrt{\sin \alpha}}{-10} = 2 \cos \alpha \cdot \sqrt{\sin \alpha}$ 2
- $y_{\text{top}} = -5(2 \cos \alpha \cdot \sqrt{\sin \alpha})^2 + 2 + 4 \sin \alpha + 20 \cdot 2(\cos \alpha \cdot \sqrt{\sin \alpha})^2$ 1
- $y_{\text{top}} = 2 + 20 \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + 4 \sin \alpha$ 1
- $y_{\text{top}} = 2 + 20 \sin \alpha \cdot (1 - \sin^2 \alpha) + 4 \sin \alpha = 2 + 24 \sin \alpha - 20 \sin^3 \alpha$ 1

12 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de waarde van α kan worden gevonden waarvoor y_{top} maximaal is 1
- $\alpha \approx 0,685$ (of nauwkeuriger) 1
- $\sin \alpha \approx 0,632$ (of nauwkeuriger) en $\cos \alpha \approx 0,774$ (of nauwkeuriger) (of $\cos \alpha \approx 0,775$ of nauwkeuriger) 1
- Dus bij benadering geldt:
 $y(t) = -5t^2 + 2 + 4 \cdot 0,632 + 20t \cdot 0,774 \cdot \sqrt{0,633} = -5t^2 + 12,3t + 4,5$ 1

13 maximumscore 5

- De vergelijking $-5t^2 + 12,3t + 4,5 = 6$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $t \approx 2,33$ (of nauwkeuriger) ($t \approx 0,13$ voldoet niet) 1
- $x(2,33) \approx 20,4$ (of nauwkeuriger) 1
- Het antwoord: 4 (m) 1

Door de asymptoot

14 maximumscore 4

- Voor een formule van g geldt $x = \ln\left(\frac{2y-1}{y+2}\right)$ 1

- Dit geeft $\frac{2y-1}{y+2} = e^x$ 1

- Herleiden tot $2y - y \cdot e^x = 1 + 2e^x$ 1

- Dit geeft $y(2 - e^x) = 1 + 2e^x$, dus $y = \frac{1 + 2e^x}{2 - e^x}$ (dus g is de inverse van f) 1

of

- Er moet gelden $g(f(x)) = x$ (voor elke x uit het domein) 1

- $g(f(x)) = \frac{1 + 2 \cdot \frac{2x-1}{x+2}}{2 - \frac{2x-1}{x+2}}$ 1

- (Teller en noemer met $x+2$ vermenigvuldigen geeft)
 $\frac{(x+2) + 2 \cdot (2x-1)}{2 \cdot (x+2) - (2x-1)}$ 1

- Dit vereenvoudigen tot $\frac{5x}{5} = x$ (dus g is de inverse van f) 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

15 maximumscore 5

- $\frac{2x-1}{x+2} = \frac{2-\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}}$ dus de horizontale asymptoot is de lijn met vergelijking $y = \ln 2$
 (of: een redenering waaruit blijkt dat de horizontale asymptoot de lijn met vergelijking $y = \ln 2$ is) 1
 - $\left| \ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) \right| = \ln 2$ geeft $\ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) = \ln 2$ of $\ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) = -\ln 2$ 1
 - Dit geeft $\frac{2x-1}{x+2} = 2$ of $\frac{2x-1}{x+2} = \frac{1}{2}$ 1
 - Een berekening waaruit volgt dat $x = \frac{4}{3}$ 2
- of
- $2 - e^x = 0$ als $x = \ln 2$, dus de lijn met vergelijking $x = \ln 2$ is de verticale asymptoot van de grafiek van g . De horizontale asymptoot van de grafiek van f heeft dus vergelijking $y = \ln 2$. 1
 - $\left| \ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) \right| = \ln 2$ geeft $\ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) = \ln 2$ of $\ln\left(\frac{2x-1}{x+2}\right) = -\ln 2$ 1
 - Dit geeft $\frac{2x-1}{x+2} = 2$ of $\frac{2x-1}{x+2} = \frac{1}{2}$ 1
 - Een berekening waaruit volgt dat $x = \frac{4}{3}$ 2

Parabool en cirkel

16 maximumscore 4

- Punt P heeft coördinaten $(p, \frac{1}{8}p^2 + 2)$ 1
- (De stelling van Pythagoras toepassen geeft)
 $FP = \sqrt{p^2 + (\frac{1}{8}p^2 + 2 - 4)^2} = \sqrt{p^2 + (\frac{1}{8}p^2 - 2)^2}$ 1
- $FP = \sqrt{\frac{1}{64}p^4 + \frac{1}{2}p^2 + 4}$ 1
- $FP = \sqrt{(\frac{1}{8}p^2 + 2)^2} = \frac{1}{8}p^2 + 2$ 1

17 maximumscore 4

- Een vergelijking van de middelloodlijn m is $y = \frac{1}{16}p^2 + 1$ 1
 - De afstand van F tot m is $4 - (\frac{1}{16}p^2 + 1) = 3 - \frac{1}{16}p^2$ 1
 - Deze afstand is gelijk aan FP als $\frac{1}{8}p^2 + 2 = 3 - \frac{1}{16}p^2$ 1
 - Dit geeft $\frac{3}{16}p^2 = 1$, dus (wegens $p > 0$) $p = \sqrt{\frac{16}{3}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- of
- Een vergelijking van c is $x^2 + (y - 4)^2 = (\frac{1}{8}p^2 + 2)^2$ 1
 - $(0, \frac{1}{16}p^2 + 1)$ ligt op c 1
 - Invullen geeft $(\frac{1}{16}p^2 - 3)^2 = (\frac{1}{8}p^2 + 2)^2$ 1
 - Dit geeft $\frac{3}{16}p^2 = 1$, dus (wegens $p > 0$) $p = \sqrt{\frac{16}{3}}$ (of een gelijkwaardige vorm) 1

5 Inzenden scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinerator in het programma WOLF.
 Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito.